WIKIPEDIA

Presbyornithidae

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Presbyornithidae sono una famiglia estinta di uccelli anseriformi dalla distribuzione globale. Questi uccelli si evolvettero nel Cretaceo superiore per poi estinguersi durante il Miocene inferiore, circa 71-15 milioni di anni fa. Inizialmente, presentando un mix di caratteristiche con altri uccelli acquatici, costieri e fenicotteri, si pensava fossero imparentati con uno di questi gruppi,[3] tuttavia, oggi sono generalmente accettati come un gruppo di uccelli acquatici strettamente imparentati con le moderne anatre, oche e kaimichi.[2]

Questi uccelli condividevano tutti una corporatura esile, con lunghi colli e gambe, un'altezza di circa 1 metro, il corpo di un'anatra, i piedi simili a quelli di un trampoliere ma provvisti di membrane, e un becco piatto, simile a quello delle anatre, adattato per filtrare il cibo. Almeno alcune specie erano uccelli sociali che vivevano in grandi stormi e nidificavano in colonie, mentre altri, come la specie *Wilaru*, erano più terrestri e solitari.[2]

Si conoscono sette generi di presbiedithithidi, tuttavia, gran parte dei loro resti rimangono ancora non descritti, come la scapola parziale destra BMNH PAL 4989, inizialmente attribuita ad *Headonornis hantoniensis*, ma che presenta tratti troppo diversi per essere assegnata d un genere noto, o i resti del Cretaceo superiore della Formazione Barun Goyot a Uday Sayr, e la Formazione Nemegt dello Tsagaan Kushu.

Presbyornithidae



Ricostruzione di *Presbyornis*

Stato di conservazione

Fossile

Classificazione scientifica

Dominio	Eukaryota
Regno	Animalia
Phylum	Chordata
Classe	Aves
Ordine	Anseriformes
Superfamiglia	Anatoidea
Genere	† ***Presbyornithidae*** *Wetmore, 1926*[1]

Generi

- † *Presbyornis* (specie tipo)
- † *Headonornis*?
- † *Telmabates*
- † *Teviornis*
- † *Proherodius*
- † *Zhylgaia*
- † *Wilaru*[2]

Note

1. ^ Wetmore, Alexander, *Fossil birds from the Green River Deposits of Easter Utah*, in *Annals of the Carnegie Museum*, vol. 16, 1926, pp. 391–402.
2. Vanesa L. De Pietri, R. Paul Scofield, Nikita Zelenkov, Walter E. Boles e Trevor H. Worthy, *The unexpected survival of an ancient lineage of anseriform birds into the Neogene of Australia: the youngest record of Presbyornithidae*, in *Royal Society Open Science*, vol. 3, n. 2, 2016, pp. 150635, DOI:10.1098/rsos.150635, PMC 4785986.
3. ^ Feduccia, Alan, *Osteological evidence for shorebird affinities of the flamingos* (PDF), in *Auk*, vol. 93, n. 3, 1976, pp. 587–601, JSTOR 4084959.

Altri progetti

- Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it) contiene immagini o altri file su **Presbyornithidae (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Presbyornithidae?uselang=it)**
- Wikispecies (https://species.wikimedia.org/wiki/?uselang=it) contiene informazioni su **Presbyornithidae (https://species.wikimedia.org/wiki/Presbyornithidae?uselang=it)**

Collegamenti esterni

-
- (EN) *Presbyornithidae*, su *Fossilworks.org*.